

肝細胞がん

2025年4月改訂

《商品名(略号)》

《投与量》

《経路》

《投与日》

《投与間隔》

カボザンチニブ療法

カボメティクス	60mg/body	分1	連日
---------	-----------	----	----

※食事の1時間前から食後2時間までの間の服用を避けねば用法変更可

ソラフェニブ療法

ネクサバール	800mg/body	分2	連日
--------	------------	----	----

※食事の1時間前から食後2時間までの間の服用を避けねば用法変更可

レンバチニブ療法

レンビマ	8~12mg/body	分1	連日
------	-------------	----	----

Atezo + Bev療法

全身療法の治療歴がない切除不能な症例

D1

Atezo	1,200mg/body	div	↓	21
Bev	15mg/kg	div	↓	

RAM単剤療法

化学療法後に増悪した血清AFP値が400ng/mL以上の切除不能な症例

D1

RAM	8mg/kg	div	↓	14
-----	--------	-----	---	----

Treme + Durva療法

D1

Treme	300mg/body	div	↓	28
Durva	1,500mg/body	div	↓	

体重≤30kgの場合はTreme 4mg/kg Durve 20mg/kg

Durvalumab単剤療法

Treme + Durva療法の2クール目以降

D1

Durva	1500mg/body	div	↓	28
-------	-------------	-----	---	----

体重30kg以下の場合は、1回量を20mg/kg

胆道がん

2025年4月改訂

《商品名(略号)》

《投与量》

《経路》

《投与日》

《投与間隔》

Durva+GEM+CDDP療法

D1

D8

Durva	1,500mg/body	div	↓	21
GEM	1,000mg/m ²	div	↓	
CDDP	25mg/m ²	div	↓	

最大8クール

Durvalumab単剤療法

Durva+GEM+CDDP療法後の維持療法

D1

Durva	1500mg/body	div	↓	28
-------	-------------	-----	---	----

体重30kg以下の場合は、1回量を20mg/kg

GC療法

1次治療

			D1	D8	
GEM	1000mg/m2	div	↓	↓	
CDDP	25mg/m2	div	↓	↓	21

GCS療法

D1 D7

GEM	1,000mg/m2	div	↓		
CDDP	25mg/m2	div	↓		14
S-1	80～120mg/body	分2	↓	… ↓ (休)	

GS療法

1次治療

D1 D8 D14

GEM	1,000mg/m2	div	↓	↓	
S-1	80～120mg/body	分2	↓	… ↓ (休)	21

GEM単剤療法

D1 D8 D15

GEM	1,000mg/m2	div	↓	↓	↓	28
-----	------------	-----	---	---	---	----

Pembro+GEM+CDDP療法

D1 D8

Pembro	200mg/body	div	↓		
GEM	1,000mg/m2	div	↓	↓	21
CDDP	25mg/m2	div	↓	↓	

最大8クール

Pembro単剤療法(q3W)

Pembro	200mg/body	div	↓		21
--------	------------	-----	---	--	----

Pembro+GEM療法

D1 D8

Pembro	200mg/body	div	↓		
GEM	1,000mg/m2	div	↓	↓	21

最大8クール

S-1単剤療法 (4投2休)

D1 D28

S-1	80～120mg/body	分2	↓	…	…	…	↓ (休)	42
-----	---------------	----	---	---	---	---	-------	----

※4投2休では継続困難の症例では2投1休

ペミガチニブ療法

D1 D14

ペミガチニブ	13.5mg/body	分1	↓	…	↓ (休)	21
--------	-------------	----	---	---	-------	----

《商品名(略号)》

《投与量》

《経路》

《投与日》

《投与間隔》

FOLFIRINOX療法

D1

L-OHP	85mg/m2	div	↓		
CPT-11	180mg/m2	div	↓		
I-LV	200mg/m2	div	↓		14
5FU(bolus)	400mg/m2	div	↓		
5FU(46時間持続)	2,400mg/m2	div	↓		

mFOLFIRINOX療法

D1

L-OHP	85mg/m2	div	↓		
CPT-11	150mg/m2	div	↓		
I-LV	200mg/m2	div	↓		14
5FU(46時間持続)	2,400mg/m2	div	↓		

nal-IRI + 5FU/LV療法

D1

オニバイド	70mg/m2	div	↓		
I-LV	200mg/m2	div	↓		
5FU(46時間持続)	2,400mg/m2	div	↓		14

S-1 + GEM療法

術前化学療法として2クール

D1 D8 D14

GEM	1,000mg/m2	div	↓	↓				21
S-1	80～120mg/body	分2	↓	…	↓	(休)		

nab-PTX + GEM(GnP)療法

D1 D8 D15

GEM	1,000mg/m2	div	↓	↓	↓			28
nab-PTX	125mg/m2	div	↓	↓	↓			

GEM単剤療法

D1 D8 D15

GEM	1,000mg/m2	div	↓	↓	↓			28
-----	------------	-----	---	---	---	--	--	----

GEM（少量）+RT療法

D1 D8 D15 D22 D29 D36

GEM	250mg/m2	div	↓	↓	↓	↓	↓	↓	42
-----	----------	-----	---	---	---	---	---	---	----

S-1単剤療法（4投2休）

術後補助の場合は6ヶ月

D1 D28

S-1	80～120mg/body	分2	↓	…	…	…	↓	(休)	42
-----	---------------	----	---	---	---	---	---	-----	----

※4投2休では継続困難の症例では2投1休

オラパリブ療法

BRCA 遺伝子変異陽性の治癒切除不能な膵がんにおける白金系抗悪性腫瘍剤を含む化学療法後の維持療法

リムパーザ	600mg/body	分2	連日	
-------	------------	----	----	--