

肝細胞がん

2024年4月改訂

《商品名(略号)》	《投与量》	《経路》	《投与日》	《投与間隔》
カボザンチニブ療法				
カボメティクス	60mg/body	分1	連日	
※食事の1時間前から食後2時間までの間の服用を避ければ用法変更可				

ソラフェニブ療法

ネクサバル	800mg/body	分2	連日	
※食事の1時間前から食後2時間までの間の服用を避ければ用法変更可				

レンバチニブ療法

レンビマ	8～12mg/body	分1	連日	
------	-------------	----	----	--

Atezo + Bev療法

全身療法の治療歴がない切除不能な症例		D1		
Atezo	1,200mg/body	div	↓	21
Bev	15mg/kg	div	↓	

RAM単剤療法

化学療法後に増悪した血清AFP値が400ng/mL以上の切除不能な症例

D1				
RAM	8mg/kg	div	↓	14

Treme + Durva療法

Treme	300mg/body	div	↓	28
Durva	1,500mg/body	div	↓	
体重 ≤ 30kgの場合はTreme 4mg/kg Durve 20mg/kg				

Durvalumab単剤療法

Treme + Durva療法の2クール目以降		D1		
Durva	1500mg/body	div	↓	28
体重30kg以下の場合は、1回量を20mg/kg				

胆道がん

2024年4月改訂

《商品名(略号)》	《投与量》	《経路》	《投与日》	《投与間隔》
Durva+GEM+CDDP療法			D1	D8
Durva	1,500mg/body	div	↓	21
GEM	1,000mg/m2	div	↓ ↓	
CDDP	25mg/m2	div	↓ ↓	
最大8クール				

Durvalumab単剤療法

Durva+GEM+CDDP療法後の維持療法		D1		
Durva	1500mg/body	div	↓	28
体重30kg以下の場合は、1回量を20mg/kg				

GC療法

1次治療		D1 D8		
GEM	1000mg/m2	div	↓ ↓	21
CDDP	25mg/m2	div	↓ ↓	

GCS療法

			D1	D7	
GEM	1,000mg/m2	div	↓		14
CDDP	25mg/m2	div	↓		
S-1	80~120mg/body	分2	↓	… ↓ (休)	

GS療法

1次治療

			D1	D8	D14	
GEM	1,000mg/m2	div	↓	↓		21
S-1	80~120mg/body	分2	↓	… ↓ (休)		

GEM単剤療法

			D1	D8	D15	
GEM	1,000mg/m2	div	↓	↓	↓	28

S-1単剤療法（4投2休）

			D1			D28	
S-1	80~120mg/body	分2	↓	…	…	↓ (休)	42

※4投2休では継続困難の症例では2投1休

膵臓がん

2022年6月改訂

《商品名(略号)》

《投与量》

《経路》

《投与日》

《投与間隔》

FOLFIRINOX療法

			D1		
L-OHP	85mg/m2	div	↓		14
CPT-11	180mg/m2	div	↓		
I-LV	200mg/m2	div	↓		
5FU(bolus)	400mg/m2	div	↓		
5FU(46時間持続)	2,400mg/m2	div	↓		

mFOLFIRINOX療法

			D1		
L-OHP	85mg/m2	div	↓		14
CPT-11	150mg/m2	div	↓		
I-LV	200mg/m2	div	↓		
5FU(46時間持続)	2,400mg/m2	div	↓		

nal-IRI + 5FU/LV療法

			D1		
オニバイド	70mg/m2	div	↓		14
I-LV	200mg/m2	div	↓		
5FU(46時間持続)	2,400mg/m2	div	↓		

S-1 + GEM療法

術前化学療法として2クール

			D1	D8	D14	
GEM	1,000mg/m2	div	↓	↓		21
S-1	80~120mg/body	分2	↓	… ↓ (休)		

nab-PTX + GEM(GnP)療法

			D1	D8	D15	
GEM	1,000mg/m ²	div	↓	↓	↓	28
nab-PTX	125mg/m ²	div	↓	↓	↓	

GEM単剤療法

			D1	D8	D15	
GEM	1,000mg/m ²	div	↓	↓	↓	28

GEM（少量） + RT療法

			D1	D8	D15	D22	D29	D36	
GEM	250mg/m ²	div	↓	↓	↓	↓	↓	↓	42

S-1単剤療法（4投2休）

術後補助の場合は6ヶ月

			D1				D28	
S-1	80～120mg/body	分2	↓	…	…	…	↓ (休)	42

※4投2休では継続困難の症例では2投1休

オラパリブ療法

BRCA 遺伝子変異陽性の治癒切除不能な膵がんにおける白金系抗悪性腫瘍剤を含む化学療法後の維持療法

リムパーザ	600mg/body	分2	連日
-------	------------	----	----