

《商品名(略号)》 《投与量》 《経路》 《投与日》 《投与間隔》

テガフル・ウラシル療法

StageⅠA,ⅠB,ⅡAの完全切除の腺がんに対する術後補助療法（1～2年間）

UFT	300～500mg/body	分2～3	連日
-----	----------------	------	----

CDDP＋VNR療法（RTなし）

StageⅡ,ⅢA期の術後補助療法

			D1	D8	
VNR	25mg/m2	div	↓	↓	21
CDDP	80mg/m2	div	↓		

CDDP＋VNR療法（RT併用）

StageⅢA T1-3N2M0の外科的切除不能およびⅢB

			D1	D8	
VNR	20mg/m2	div	↓	↓	28
CDDP	80mg/m2	div	↓		

CBDCA＋PTX療法

StageⅢ期/Ⅳ期のドライバー遺伝子変異/転座陰性

			D1		
PTX	200mg/m2	div	↓		21
CBDCA	6AUC/body	div	↓		

CBDCA＋PTX療法（RT併用）

StageⅢ期

			D1	D8	D15	D22	D29	D36	
PTX	40mg/m2	div	↓	↓	↓	↓	↓	↓	42
CBDCA	2AUC/body	div	↓	↓	↓	↓	↓	↓	

CDDP＋DTX療法

StageⅢ期

			D1		
DTX	60mg/m2	div	↓		21
CDDP	80mg/m2	div	↓		

CDDP＋DTX療法（RT併用）

StageⅢ期

			D1	D8	
DTX	40mg/m2	div	↓	↓	28
CDDP	40mg/m2	div	↓	↓	

低用量CBDCA療法（RT併用）

高齢者に対するStageⅢ期

			D1-5	D8-12	D15-19	D22-26	
CBDCA	30mg/m2	div	↓	↓	↓	↓	42

化学療法は、平日5日間（計20日間）＋同時胸部放射線照射60Gy（2Gy×30回）

Nivo + CBDCA + PTX療法

化学療法未治療のStage I B、II、III A期の非小細胞肺癌における術前化学療法

D1				
Nivo	360mg/body	div	↓	21
PTX	200mg/m2	div	↓	
CBDCA	6AUC/body	div	↓	

3コース

Nivo + PEM + CDDP療法

化学療法未治療のStage I B、II、III A期の非扁平上皮がんにおける術前化学療法

D1				
Nivo	360mg/body	div	↓	21
PEM	500mg/m2	div	↓	
CDDP	75mg/m2	div	↓	

3コース

Nivo + GEM + CDDP療法

化学療法未治療のStage I B、II、III A期の扁平上皮がんにおける術前化学療法

D1 D8				
Nivo	360mg/body	div	↓	21
GEM	1000mg/m2	div	↓ ↓	
CDDP	75mg/m2	div	↓	

3コース

Durva + Treme + PEM + CBDCA療法

Stage III, IV期の切除不能な進行・再発非小細胞肺癌(非扁平上皮がん)

D1				
Durva	1500mg/body	div	↓	21
Treme	75mg/body	div	↓	
PEM	500mg/m2	div	↓	
CBDCA	5AUC/body	div	↓	

4コース

Durva + Treme + CBDCA + nab-PTX療法

Stage IV期のドライバー遺伝子変異陰性・転座陰性の非小細胞肺癌

D1 D8 D15				
Durva	1500mg/body	div	↓	21
Treme	75mg/body	div	↓	
CBDCA	6AUC/body	div	↓	
nab-PTX	100mg/m2	div	↓ ↓ ↓	

4コース

Durva + Treme療法 [維持療法①]

Treme + Druva + 白金製剤併用療法後の維持療法

D1 D29				
Durva	1500mg/body	div	↓ ↓	56
Treme	75mg/body	div	↓	

1コース終了後維持療法②へ

Durva + Treme療法 [維持療法②]

Treme + Druva + 白金製剤併用療法後の維持療法

D1

Durva	1500mg/body	div	↓	28
-------	-------------	-----	---	----

Pembro + CBDCA + PTX療法

StageⅣ期のドライバー遺伝子変異/転座陰性（扁平上皮がん）

D1

Pembro	200mg/body	div	↓	21
PTX	200mg/m2	div	↓	
CBDCA	6AUC/body	div	↓	

4コース終了後、増悪を認めなければPembro単剤の維持療法を考慮

Pembro + CBDCA + nab-PTX療法

StageⅣ期のドライバー遺伝子変異/転座陰性（扁平上皮がん）

D1 D8 D15

Pembro	200mg/body	div	↓	21
nab-PTX	100mg/m2	div	↓ ↓ ↓	
CBDCA	6AUC/body	div	↓	

4コース終了後、増悪を認めなければPembro単剤の維持療法を考慮

Pembro + PEM + CBDCA療法

StageⅣ期のドライバー遺伝子変異/転座陰性（非扁平上皮がん）

D1

Pembro	200mg/body	div	↓	21
PEM	500mg/m2	div	↓	
CBDCA	5AUC/body	div	↓	

4コース終了後、増悪を認めなければPEM + Pembroの維持療法を考慮

Pembro + PEM + CDDP療法

StageⅣ期のドライバー遺伝子変異/転座陰性（非扁平上皮がん）

D1

Pembro	200mg/body	div	↓	21
PEM	500mg/m2	div	↓	
CDDP	75mg/m2	div	↓	

4コース終了後増悪を認めなければPEM + Pembroの維持療法を考慮

Pembro + PEM療法

StageⅣ期の非扁平上皮がんに対する維持療法

D1

Pembro	200mg/body	div	↓	21
PEM	500mg/m2	div	↓	

Pembro単剤療法(q3W)

PD-L1陽性の非小細胞肺癌（維持療法）

D1

Pembro	200mg/body	div	↓	21
--------	------------	-----	---	----

Pembro単剤療法(q6W)

PD-L1陽性の非小細胞肺癌（維持療法）

D1

Pembro	400mg/body	div	↓	42
--------	------------	-----	---	----

PEM + CBDCA療法

StageⅢ期またはStageⅣ期のドライバー遺伝子変異/転座陰性（非扁平上皮がん）

D1

PEM	500mg/m ²	div	↓	21
CBDCA	5～6AUC/body	div	↓	

PEM + CDDP療法

StageⅣ期のドライバー遺伝子変異/転座陰性（非扁平上皮がん）

D1

PEM	500mg/m ²	div	↓	21
CDDP	75mg/m ²	div	↓	

4コース終了後、増悪を認めなければPEM単剤の維持療法を考慮

PEM単剤療法

StageⅢ,Ⅳ期の非扁平上皮がんに対する維持療法

D1

PEM	500mg/m ²	div	↓	21
-----	----------------------	-----	---	----

Bev + PEM + CBDCA療法

StageⅢ,Ⅳ期の非扁平上皮がん

D1

Bev	15mg/kg	div	↓	21
PEM	500mg/m ²	div	↓	
CBDCA	6AUC/body	div	↓	

Bev + PEM + CDDP療法

StageⅢ,Ⅳ期の非扁平上皮がん

D1

Bev	15mg/kg	div	↓	21
PEM	500mg/m ²	div	↓	
CDDP	75mg/m ²	div	↓	

Bev + PEM療法

StageⅢ,Ⅳ期の非扁平上皮がんに対する維持療法

D1

Bev	15mg/kg	div	↓	21
PEM	500mg/m ²	div	↓	

Atezo + Bev + CBDCA + PTX療法

StageⅣ期のドライバー遺伝子変異/転座陰性（非扁平上皮がん）

D1

Bev	15mg/kg	div	↓	21
Atezo	1200mg/body	div	↓	
PTX	200mg/m ²	div	↓	
CBDCA	6AUC/body	div	↓	

4～6コース終了後、増悪を認めなければAtezo + Bevの維持療法を考慮

Atezo + Bev療法

維持療法

		D1		
Bev	15mg/kg	div	↓	21
Atezo	1200mg/body	div	↓	

Atezo + PEM + CBDCA療法

化学療法未治療のStageIV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性（非扁平上皮がん）

		D1		
Atezo	1200mg/body	div	↓	21
PEM	500mg/m2	div	↓	
CBDCA	6AUC/body	div	↓	

4～6コース

Atezo + PEM療法

化学療法未治療のStageIV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性（非扁平上皮がん）

		D1		
Atezo	1200mg/body	div	↓	21
PEM	500mg/m2	div	↓	

Atezo + PEM + CBDCA療法後の維持療法

Atezo + CBDCA + nab-PTX療法

StageIV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性（非扁平上皮がん）

		D1 D8 D15		
Atezo	1200mg/body	div	↓	21
nab-PTX	100mg/m2	div	↓ ↓ ↓	
CBDCA	6AUC/body	div	↓	

4コース終了後、増悪を認めなければAtezo単剤の維持療法を考慮

Atezo + CBDCA + PTX療法

StageIV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性（非扁平上皮がん）

		D1		
Atezo	1200mg/body	div	↓	21
PTX	200mg/m2	div	↓	
CBDCA	6AUC/body	div	↓	

4～6コース終了後、増悪を認めなければAtezo単剤の維持療法を考慮

Bev単剤療法

Bev + プラチナ製剤による化学療法後の維持療法

		D1		
Bev	15mg/kg	div	↓	21

Bev + Erlotinib療法

化学療法治療歴のないEGFR陽性非小細胞肺がん

		D1		
Bev	15mg/kg	div	↓	21
タルセバ	150mg/body	分1	連日	

CBDCA + GEM療法

StageIV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性

		D1 D8		
GEM	1,000mg/m2	div	↓ ↓	21
CBDCA	5AUC/body	div	↓	

CBDCA + nab-PTX療法

StageIV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性

			D1	D8	D15	
nab-PTX	100mg/m2	div	↓	↓	↓	21
CBDCA	6AUC/body	div	↓			

CDDP + CPT-11療法

			D1	D8	D15	
CPT-11	60mg/m2	div	↓	↓	↓	21
CDDP	80mg/m2	div	↓			

CDDP + GEM療法

			D1	D8	
GEM	1,000mg/m2	div	↓	↓	21
CDDP	80mg/m2	div	↓		

RAM + DTX療法

StageIV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性

			D1		
RAM	10mg/kg	div	↓		21
DTX	60mg/m2	div	↓		

Nivo + Ipi療法

StageIV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性

			D1	D22	
Nivo	360mg/body	div	↓	↓	42
ヤーボイ	1mg/kg	div	↓		

S-1 + CBDCA療法

StageIV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性

			D1	D14	
S-1	80~120mg/body	分2	↓	… ↓ (休)	21
CBDCA	5AUC/body	div	↓		

デュルバルマブ単剤療法

根治的化学放射線療法後の維持療法／切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

			D1	
Durva	1500mg/body	div	↓	28

維持療法の場合は1年

TDxd療法

がん化学療法後に増悪したHER2遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

			D1	
トラスツズ マブ デ ルクステカン	5.4mg/kg	div	↓	21

Nivo単剤療法(q2W)

2次治療

			D1	
Nivo	240mg/body	div	↓	14

Nivo単剤療法(q4W)

2次治療

D1

Nivo	480mg/body	div	↓	28
------	------------	-----	---	----

DTX単剤療法

2次治療

D1

DTX	60mg/m2	div	↓	21
-----	---------	-----	---	----

GEM単剤療法

2次治療

D1 D8

GEM	1,000mg/m2	div	↓ ↓	21
-----	------------	-----	-----	----

wPTX単剤療法

2次治療

D1 D8 D15

PTX	80mg/m2	div	↓ ↓ ↓	28
-----	---------	-----	-------	----

VNR単剤療法

2次治療

D1 D8

VNR	25mg/m2	div	↓ ↓	21
-----	---------	-----	-----	----

Day15は中止の場合が多いため省略している。

nab-PTX単剤療法

2次治療

D1 D8 D15

nab-PTX	100mg/m2	div	↓ ↓ ↓	21
---------	----------	-----	-------	----

Atezo単剤療法

化学療法既治療の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

D1

Atezo	1,200mg/body	div	↓	21
-------	--------------	-----	---	----

S-1単剤療法(4投2休)

2次治療

D1

D28

S-1	80~120mg/body	分2	↓ ↓ (休)	42
-----	---------------	----	-----------------	----

アファチニブ療法

EGFR遺伝子変異(exon19欠失またはexon21L858R変異)陽性の非小細胞肺癌

ジオトリフ	40mg/body	分1	連日
-------	-----------	----	----

※食事の1時間前から食後3時間までの間の服用を避ければ用法変更可

アレクチニブ療法

ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発非小細胞肺癌

アレセンサ	600mg/body	分2	連日
-------	------------	----	----

エルロチニブ療法

EGFR遺伝子変異(exon19欠失またはexon21L858R変異)陽性の非小細胞肺癌

タルセバ	150mg/body	分1	連日
------	------------	----	----

※食事の1時間前から食後2時間までの間の服用を避ければ用法変更可

オシメルチニブ療法

EGFR遺伝子変異(exon19欠失またはexon21L858R変異)陽性の非小細胞肺癌

タグリッソ	80mg/body	分1	連日
-------	-----------	----	----

ゲフィチニブ療法

EGFR遺伝子変異(exon19欠失またはexon21L858R変異)陽性の非小細胞肺癌

イレッサ	250mg/body	分1	連日
------	------------	----	----

セリチニブ療法

ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発非小細胞肺癌

ジカディア	450mg/body	分1	連日
-------	------------	----	----

テポチニブ療法

MET遺伝子exon14スキッピング変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

テプミトコ	500mg/body	分1	連日
-------	------------	----	----

ロルラチニブ療法

ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発非小細胞肺癌

ローブレナ	100mg/body	分1	連日
-------	------------	----	----