

《商品名(略号)》

《投与量》

《経路》

《投与日》

《投与間隔》

mFOLFOX6療法

HER2(-)の1次治療

D1

|             |            |     |   |    |
|-------------|------------|-----|---|----|
| L-OHP       | 85mg/m2    | div | ↓ | 14 |
| I-LV        | 200mg/m2   | div | ↓ |    |
| 5FU(bolus)  | 400mg/m2   | div | ↓ |    |
| 5FU(46時間持続) | 2,400mg/m2 | div | ↓ |    |

SOX療法

HER2(-)の1次治療

D1

D14

|       |               |     |             |    |
|-------|---------------|-----|-------------|----|
| L-OHP | 100mg/m2      | div | ↓           | 21 |
| S-1   | 80~120mg/body | 分2  | ↓ ... ↓ (休) |    |

S-1 + CDDP療法

HER2(-)の1次治療

D8

D21

|      |               |     |             |    |
|------|---------------|-----|-------------|----|
| CDDP | 60mg/m2       | div | ↓           | 35 |
| S-1  | 80~120mg/body | 分2  | ↓ ... ↓ (休) |    |

XELOX (CapeOX) 療法

HER2(-)の1次治療 StageⅢB、ⅢCの術後補助療法の場合は6か月

D1

D14

|       |                    |     |             |    |
|-------|--------------------|-----|-------------|----|
| L-OHP | 130mg/m2           | div | ↓           | 21 |
| Cape  | 2,400~4,200mg/body | 分2  | ↓ ... ↓ (休) |    |

※末梢投与時は、血管痛予防のためDEX1.65mgを混注して投与

XP療法

HER2(-)の1次治療

D1

D14

|      |                    |     |             |    |
|------|--------------------|-----|-------------|----|
| CDDP | 80mg/m2            | div | ↓           | 21 |
| Cape | 2,400~4,200mg/body | 分2  | ↓ ... ↓ (休) |    |

Nivo + SOX療法

HER2(-)の1次治療

D1

D14

|       |               |     |             |    |
|-------|---------------|-----|-------------|----|
| Nivo  | 360mg/body    | div | ↓           | 21 |
| L-OHP | 100mg/m2      | div | ↓           |    |
| S-1   | 80~120mg/body | 分2  | ↓ ... ↓ (休) |    |

Nivo + XELOX (CapeOX) 療法

HER2(-)の1次治療

D1

D14

|       |                    |     |             |    |
|-------|--------------------|-----|-------------|----|
| Nivo  | 360mg/body         | div | ↓           | 21 |
| L-OHP | 130mg/m2           | div | ↓           |    |
| Cape  | 2,400~4,200mg/body | 分2  | ↓ ... ↓ (休) |    |

※末梢投与時は、血管痛予防のためDEX1.65mgを混注して投与

# Nivo + mFOLFOX6療法

## HER2(-)の1次治療

|             |            | D1  |   | 14 |
|-------------|------------|-----|---|----|
| Nivo        | 240mg/body | div | ↓ |    |
| L-OHP       | 85mg/m2    | div | ↓ |    |
| I-LV        | 200mg/m2   | div | ↓ |    |
| 5FU(bolus)  | 400mg/m2   | div | ↓ |    |
| 5FU(46時間持続) | 2,400mg/m2 | div | ↓ |    |

# Tmab + SOX療法

## HER2(+ )の1次治療

|       |               | D1  |   | D14 |       | 21 |
|-------|---------------|-----|---|-----|-------|----|
| Tmab  | 8 (6)mg/kg    | div | ↓ |     |       |    |
| L-OHP | 100mg/m2      | div | ↓ |     |       |    |
| S-1   | 80~120mg/body | 分2  | ↓ | …   | ↓ (休) |    |

※ ( ) 内は2回目以降の投与量

# Tmab + XELOX (CapeOX) 療法

## HER2(+ )の1次治療

|       |                    | D1  |   | D14 |       | 21 |
|-------|--------------------|-----|---|-----|-------|----|
| Tmab  | 8 (6)mg/kg         | div | ↓ |     |       |    |
| L-OHP | 130mg/m2           | div | ↓ |     |       |    |
| Cape  | 2,400~4,200mg/body | 分2  | ↓ | …   | ↓ (休) |    |

※ ( ) 内は2回目以降の投与量

※末梢投与時は、血管痛予防のためDEX1.65mgを混注して投与

# Tmab + XP療法

## HER2(+ )の1次治療

|      |                    | D1  |   | D14 |       | 21 |
|------|--------------------|-----|---|-----|-------|----|
| Tmab | 8 (6)mg/kg         | div | ↓ |     |       |    |
| CDDP | 80mg/m2            | div | ↓ |     |       |    |
| Cape | 2,400~4,200mg/body | 分2  | ↓ | …   | ↓ (休) |    |

※ ( ) 内は2回目以降の投与量

# Tmab + wPTX療法

## HER2(+ )の2次治療以降のオプション

|      |            | D1  |   | D8 |  | 21 |
|------|------------|-----|---|----|--|----|
| Tmab | 8 (6)mg/kg | div | ↓ |    |  |    |
| PTX  | 80mg/m2    | div | ↓ | ↓  |  |    |

※ ( ) 内は2回目以降の投与量

# トラスツマブ デルステカン療法

## HER2(+ )の2次治療以降のオプション

|       |          | D1  |   | 21 |
|-------|----------|-----|---|----|
| エンハーツ | 6.4mg/kg | div | ↓ |    |

# RAM + wPTX療法

## 2次治療

|     |         | D1  |   | D8 |   | D15 |  | 28 |
|-----|---------|-----|---|----|---|-----|--|----|
| RAM | 8mg/kg  | div | ↓ |    |   | ↓   |  |    |
| PTX | 80mg/m2 | div | ↓ | ↓  | ↓ |     |  |    |

# RAM + nab-PTX療法

2 次治療

D1 D8 D15

|         |          |     |   |   |    |
|---------|----------|-----|---|---|----|
| RAM     | 8mg/kg   | div | ↓ | ↓ | 28 |
| nab-PTX | 100mg/m2 | div | ↓ | ↓ |    |

# RAM単剤療法

2 次治療

D1

|     |        |     |   |    |
|-----|--------|-----|---|----|
| RAM | 8mg/kg | div | ↓ | 14 |
|-----|--------|-----|---|----|

# Nivo単剤療法(q2W)

3 次治療

D1

|      |            |     |   |    |
|------|------------|-----|---|----|
| Nivo | 240mg/body | div | ↓ | 14 |
|------|------------|-----|---|----|

# Nivo単剤療法(q4W)

3 次治療

D1

|      |            |     |   |    |
|------|------------|-----|---|----|
| Nivo | 480mg/body | div | ↓ | 28 |
|------|------------|-----|---|----|

# nab-PTX単剤療法(A法)

3 次治療

D1

|         |          |     |   |    |
|---------|----------|-----|---|----|
| nab-PTX | 260mg/m2 | div | ↓ | 21 |
|---------|----------|-----|---|----|

# nab-PTX単剤療法(D法)

2～3 次治療

D1 D8 D15

|         |          |     |   |   |   |    |
|---------|----------|-----|---|---|---|----|
| nab-PTX | 100mg/m2 | div | ↓ | ↓ | ↓ | 28 |
|---------|----------|-----|---|---|---|----|

# DTX療法

2～3 次治療

D1

|     |         |     |   |    |
|-----|---------|-----|---|----|
| DTX | 60mg/m2 | div | ↓ | 21 |
|-----|---------|-----|---|----|

# CPT-11療法

2～3 次治療

D1 D15

|        |          |     |   |   |    |
|--------|----------|-----|---|---|----|
| CPT-11 | 150mg/m2 | div | ↓ | ↓ | 42 |
|--------|----------|-----|---|---|----|

# wPTX療法

2～3 次治療

D1 D8 D15

|     |         |     |   |   |   |    |
|-----|---------|-----|---|---|---|----|
| PTX | 80mg/m2 | div | ↓ | ↓ | ↓ | 28 |
|-----|---------|-----|---|---|---|----|

# FTD/TPI療法

3 次治療

D1 D5 D8 D12

|         |               |    |   |   |   |     |   |   |   |     |    |
|---------|---------------|----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|----|
| FTD/TPI | 70～150mg/body | 分2 | ↓ | … | ↓ | (休) | ↓ | … | ↓ | (休) | 28 |
|---------|---------------|----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|----|

## S-1療法（4投2休）

Stage II or III の術後補助療法の場合は1年

D1

D28

|     |               |    |   |   |   |   |   |     |    |
|-----|---------------|----|---|---|---|---|---|-----|----|
| S-1 | 80～120mg/body | 分2 | ↓ | … | … | … | ↓ | (休) | 42 |
|-----|---------------|----|---|---|---|---|---|-----|----|

※4投2休では継続困難の症例では2投1休

## S-1 + DTX療法

pStage III の術後補助療法の場合はS-1 1コース後に本治療を6コース行う。

D1

D14

|     |               |     |   |     |   |     |  |  |    |
|-----|---------------|-----|---|-----|---|-----|--|--|----|
| DTX | 40mg/m2       | div | ↓ |     |   |     |  |  | 21 |
| S-1 | 80~120mg/body | 分2  | ↓ | ... | ↓ | (休) |  |  |    |

※S-1は開始から合計1年間内服。